




火事と救急は 119 番!!



富良野消防署 占冠支署の方に お聞きしました

事故や火事の際は、慌てずに落ち着いて **119番** を押してください。

- ・ 家の電話から119番をかけたら、占冠支署に直接つながります。
- ・ 携帯電話から119番をかけると、まず富良野消防本部につながります。

そこで、現場が占冠である事をしっかりと伝えてください。

富良野消防本部より占冠支署に電話が転送されますので


電話を切らずにそのままお待ちください。

占冠支署につながりましたら、お話しください。

※ 携帯電話からかける場合は

0167-56-2119番へ

かけて頂くと直に占冠支署へつながります。



Q1 消防署にはいつも何人くらいいるんですか？

A 日中は6名、夜間は3名で勤務しています。

Q2 救急救命士は何人いますか？

A 平成23年4月1日現在で6名です。

Q3 救急救命士さんができる治療内容はどこまで？

A 救急救命士は救命士の法律で定められています。
お医者さんの指示下の治療人です。
たくさんあるので今度、皆さんで消防署に見学に来てください。
その時に実際に救急救命士ができる行為をお見せします。

Q4 子供が腕や足を切ったりした場合、救急車に運んでもらうまでもないが、かなりの出血がある場合は止血だけでもしてもらって、後は自分で病院に向かったりするの、可能ですか？
又、もしそのようなことが起きた時の自分でできる対応方法を教えてください。

A まず最初の質問ですが、「可能です」・・・出血の程度によりますが大出血の場合は生命の危険性があります。
また、動脈が切れた場合は特に出血量が多くなります。
出血量が多いかな？と思ったら救急車を要請してください。
次の質問ですが、切った所を心臓より高くして、清潔なガーゼ等で直接切った所を圧迫してください。
その対処法で普通の出血であれば止まります。
また、出血が止まらない場合は、圧迫したガーゼを取らずにその上から再度圧迫してください。

Q5 鋭利な物（えんぴつ・割り箸など）が腕などに刺さってしまった場合は、すぐに抜いたほうが良いのでしょうか？

A それは刺さった場所、深さによります。
刺さった物そのもので、止血されているかもしれないので、抜くと大出血を起こす可能性があります。
また、抜くときに他の血管や皮膚を痛めてしまう恐れがあるからです。
救急車を呼ぶか、医療機関で診てもらいましょう。



Q6 今まで（過去10年間位で）救急車の中で出産した人、しそようになった人はいましたか？

A 出産した人はいませんが、破水や出産しそようになった人はいます。
ちなみに占冠支署の救急隊はいざというために教育を受けています。

Q7 主人も親もいないときに産気づいたら、救急車を呼んでもいいですか？
その際、出産予定病院が旭川の病院の場合旭川まで行ってもらえますか？

A 救急車を要請してください。
また、占冠村の保健師さんから事前に出産が近い方がいらっしゃる旨、
連絡が入る事も有ります。
次に、搬送先の病院ですが、妊婦さんの状態にもよりますが、
主治医と相談して決めることも出来ます。

Q8 救急車が出動中に別の救急要請があったらどうするの？


A 現在、占冠支署には2台の救急車がありますので、安心してください。
また、近隣の救急車を要請することも可能です。

Q9 消防士さん（救急隊）達から、子育て中のお母さん・お父さんに「これだけは是非知って
おいたら良い」という情報・注意すること・アドバイスなどをお願いします。

A ほとんどの事故は【チョット目を離した瞬間】が多いです。・・・だろは禁物。
救急車要請時には、適切な情報等を教えてください。とても大切なことです。
また、特殊な場合は、電話で口頭指導をしますのでご安心ください。

占冠支署では、『対象者に合わせた応急手当て・AED取扱い』を
随時行いますので気軽にご相談ください。

※ お答えして頂いたのは、占冠支署 救急・救助係のみなさんでした。



小児用AEDについて

AEDを使うのは、大人だけではありません。

子どもも心停止の状態になる可能性はないとは言えません。

実際に、胸にボールが当たり、心停止の状態になった事例も報告されています。

2004年に日本で初めて一般人によるAED使用が認められ、

2006年には子どもに対してもAEDを使用することが認められました。

小児用は1歳以上8歳未満(25Kg以下)に使用し、成人用は8歳以上で使用します。

しかし、小児対応のAEDが設置されている施設はまだ多いとは言えません。


通常のAEDは成人用であるため、これを子供に対して使用する場合は、
「電極パッドが重ならないようにすること」です。

倒れている子が何歳くらいで体重が何キロか、判断できないかもしれません。

迷ったときには成人用を使用するべきでしょう。

また、もし倒れた子供(8歳未満)のそばに、あなた一人しかおらず、その子供の
意識・呼吸がない場合には、気道を確保して2分間心肺蘇生法を行ってから
119番に通報してください。

乳児(1歳未満)の場合には、AEDは使用出来ませんので注意してください。



占冠には、
役場・コミュニティプラザ・
トナム支所

各学校に設置してあります。



※ 誤飲がおこったらどうしたらいいの？

1 原因物質の確認

まず、何を飲んだのか、原因物質を確認します。

散らかっている空き瓶や空き箱など周囲の状況から原因物質を特定しなければならないこともあります。

また、残っている量から飲んだ量を推定することも重要なポイントです。

2 応急手当

意識があり、呼吸も脈拍も異常がない場合に行います。

(意識がない、けいれんを起こしているなど、すでに重篤な症状がある場合は、直ちに救急車を呼びます。)

① 食べた場合・飲んだ場合

・家庭で吐かせることはすすめられていません。

(吐いたものが気管にはいつてしまうことがあり、大変危険です。)

×絶対に吐かせてはいけないもの×

石油製品 (灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など)
→気管に入ると肺炎を起こす

容器に「酸性」または「アルカリ性」と書かれている製品
(漂白剤、トイレ用洗剤、換気扇用洗剤など)
→食道から胃にかけての損傷をよりひどくしてしまう。

防虫剤の樟脳 (しょうのう)、なめくじ駆除剤など
→けいれんを起こす可能性がある

・牛乳または水を飲ませて薄める (効果は牛乳のほうが高い)

口の中、食道、胃の粘膜に刺激があり、炎症を起こすものを飲んでしまった場合に、化学製品を薄めて、粘膜への刺激を和らげます。

○飲ませたほうがよいもの○

容器に「酸性」または「アルカリ性」と書かれている製品
(漂白剤、トイレ用洗剤、換気扇用洗剤など)

界面活性剤を含んでいる製品
(洗濯用洗剤、台所用洗剤、シャンプー、石けんなど)

石灰乾燥剤、除湿剤など

×飲ませると症状が悪化する可能性があるもの×

石油製品 (灯油、マニキュア、除光液、液体の殺虫剤など)
→吐きやすくなり、吐いたものが気管に入ると肺炎を起こす、牛乳に含まれる脂肪に溶けて、体内に吸収されやすくなる。

牛乳×
水×

タバコ、タバコの吸い殻

牛乳×

→ニコチンが水に溶けて、体内に吸収されやすくなる	水×
防虫剤の（樟脳（しょうのう）、ナフタレン、パラジクロ ルベンゼン） →牛乳に含まれる脂肪に溶けて、体内に吸収されやすくな る	牛乳×

- ② 吸い込んだ場合
きれいな空気のある場所へ移動する
- ③ 眼に入った場合
こすらない、すぐに流水で 10 分以上洗う
- ④ 皮膚についた場合
すぐに大量の流水で洗う

